

convexe recouvrant complètement la tête, pointillé, sillonné le long de sa base: tibias, tarsi et ventre, à l'exception des trois derniers segments, noirs.

Cette Luciole a la coloration des parties supérieures analogue à celle de *L. noctivaga* Ern. Oliv., mais elle s'en éloigne par la couleur noire de l'abdomen et par la forme de son prothorax convexe, quadrangulaire, au lieu d'être anguleux dans le milieu de son bord antérieur.

DIAGNOSES D'UN COLÉOPTÈRE *HYLOPHILUS*
ET DE CINQ COLÉOPTÈRES *ANTHICIDES EXOTIQUES* [COL. *HÉTÉROMÈRES*],

PAR MAURICE PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les Insectes décrits ici font partie de la collection Léon Fairmaire acquise par le Muséum et proviennent: le *Hylophilus*, des chasses de Flohr au Mexique; l'*Anthicomorphus* et les *Tomoderus*, de Singapore⁽¹⁾; enfin l'*Anthicus*, de l'Afrique australe.

***Hylophilus peregrinus* nov. sp.**

Satis elongatus, subnitidus, griseo-pubescentis, supra rufo-testaceus, capite postice scutelloque nigropiceis, elytris ad medium late fusco fasciatis, infra corpore nigro: antennis pedibusque testaceis et gracilibus.

Cette espèce un peu brillante est revêtue d'une pubescence grisâtre non soulevée, peu distincte: elle est noire en-dessous et presque entièrement testacée-roussâtre en-dessus; la tête, un peu plus large que le prothorax, est rousse en avant, noirâtre en arrière, subtronquée postérieurement; les yeux gris moyens sont très éloignés entre eux et ne touchent pas le bord postérieur de la tête; les antennes testacées sont assez longues, grêles à la base, un peu épaissies à l'extrémité: le 2^e article est plus court que le 3^e et le dernier à peine plus long que le précédent; le prothorax testacé est en carré long, fortement et densément ponctué, les élytres sont larges, pas très longs, fortement ponctués, dépourvus de dépression nette, testacés-roussâtres et ornés d'une large fascie médiane d'un brun noirâtre sinuée, plus large vers la suture; les pattes sont testacées et grêles. — Longueur, 2 millim. 5.

Mexique: Real del Monte.

Paraît voisin de *H. fragilis* Champ. (*ex description*); en différencierait au moins par les élytres fasciés et les yeux moins grands.

⁽¹⁾ Peut-être ces espèces proviennent-elles des chasses de Raffray.

Anthicomorphus rufithorax nov. sp.

Elongatus, rufo-testaceus, nitidus, luteo-pubescens et griseo-hirsutus, oculis nigris, elytris rufo-testaceis anterieus in disco et ad suturam longitudinaliter nigro notatis; antennis, palpis pedibusque testaceis.

Cette espèce offre les principaux caractères suivants : tête grosse, rétrécie derrière les yeux et légèrement impressionnée sur le vertex en arrière; prothorax assez robuste, modérément long, densément et fortement ponctué, élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles, ornés d'une bande suturale noire qui commence en-dessous de l'écusson et se termine bien avant le sommet; dessus du corps hérissé de quelques poils dressés, clairs. — Longueur, 5 millimètres.

Singapore.

Espèce voisine de l'*A. suturalis* Lewis, très distincte à première vue par la coloration de son avant-corps et la bande suturale noire des élytres plus réduite.

Tomoderus tuberculatus nov. sp.

Satis brevis et latus, nitidus, rufo-testaceus, griseo-pilosus, antennis brevibus pedibusque testaceis; thorace robusto, haud sulcato, lobis apice subdentatis; elytris brevibus, apice subrotundatis, humeris prominulis et callosis, fortiter et irregulariter punctatis.

Espèce de coloration concolore avec les yeux gris, robuste et large, à tête faiblement ponctuée, grosse et large, à prothorax très large, cependant un peu plus long que large, celui-ci de forme particulière, fortement entaillé entre les lobes, qui sont munis chacun, et de chaque côté, d'une sorte de dent foncée latérale, le lobe antérieur postérieurement, le lobe postérieur antérieurement, ce qui donne à ce dernier une forme très transversale; le prothorax est fortement ponctué sur son étranglement et faiblement sur sa portion antérieure; élytres bien caractérisés par leurs épaules qui présentent une saillie tuberculeuse; antennes courtes, très épaissies presque dès la base. — Longueur, 3 millimètres.

Singapore.

Par sa forme se rapproche de *T. Bivoi* Pic, mais le prothorax n'est pas sillonné et de structure très particulière; les élytres sont tout autres : par les épaules offrant une saillie tuberculeuse et la forme de son prothorax, cette espèce est facile à reconnaître entre toutes.

Tomoderus rugulosus nov. sp.

Satis brevis et latus, nitidus, rufo-testaceus, griseo pilosus; antennis rufo-testaceis, apice pallidis, pedibus rufo-testaceis; thorace robusto, haud sulcato, ruguloso; elytris satis brevibus, apice attenuatis et subrotundatis, humeris prominulis, fortiter sat dense punctatis.

Cette espèce présente les principaux caractères suivants : tête grosse, subarquée postérieurement, à ponctuation forte et peu écartée, yeux gris : antennes assez longues, robustes, plus épaisses à l'extrémité, roussâtres avec la base plus claire et les trois derniers articles pâles; prothorax fortement, densément et ruguleusement ponctué, à lobe antérieur fortement dilaté-arrondi, et postérieur élargi en arrière; élytres assez courts et larges, atténués postérieurement, à épaulés marquées mais un peu arrondies, ornés d'une ponctuation irrégulière forte et plus rapprochée en avant surtout derrière l'écusson; dessus du corps hérissé de poils dressés assez nombreux. — Longueur, 3 millim. 3.

Singapore.

Par sa forme, voisin du précédent, mais élytres moins courts et non tuberculés aux épaulés, prothorax de structure ordinaire, c'est-à-dire à lobes non anguleux, ponctuation différente, plus ou moins rugueuse sur l'avant-corps.

Tomoderus singaporensis nov. sp.

Subovatus, nitidus, rufo-testaceus, griseo-pilosus: antennis nigris, ad basin rufis, articulo ultimo pallido; thorace elongato, haud sulcato; elytris oblongo-ovatis, apice subtruncatis, humeris paulum prominalis et subrotundatis, modice et sparse punctatis: pedibus testaceis.

Cette espèce offre les principaux caractères suivants : tête plus large que le prothorax, subtronquée postérieurement, indistinctement ponctué, yeux gris, prothorax long, indistinctement ponctué, sauf sur l'étranglement qui est rugueux, à lobe antérieur fortement dilaté-arrondi, postérieur élargi en arrière, antennes assez épaisses, noires avec la base roussâtre et le dernier article pâle; élytres assez longs, bien plus larges que le prothorax, à ponctuation forte et disposée éparsément sans ordre, dessus du corps hérissé de quelques poils dressés; pattes peu robustes. — Longueur, près de 4 millimètres.

Singapore.

De forme plus allongée que les espèces précédentes; peut prendre place près de *T. pallidus* Pic, en diffère par un prothorax différent, les antennes presque entièrement noires, etc.

Anthicus lineaticeps nov. sp.

Elongatus, subdepressus, griseo-pubescens, capite thoraceque densissime punctatis, subopacis, nigro piceis. elytris nitidis, rufescentibus, lateraliter nigro-notatis, infra corpore nigro, antennis pedibusque testaceis, femoribus brunnescentibus.

Espèce de coloration plus ou moins foncée, avec les membres plus ou moins testacés et les élytres d'un roussâtre clair marqués de foncé latérale-

ment. Tête grosse, subtronquée postérieurement, densément ponctuée avec une ligne médiane lisse brillante; antennes moyennes; prothorax un peu plus long que large, densément ponctué, assez largement dilaté, arrondi en avant, presque droit sur la base: élytres à ponctuation forte et peu écartée, presque parallèles, subtronqués au sommet, à très faible dépression posthumérale, d'un roussâtre clair et ornés d'une sorte de bordure latérale foncée irrégulière, qui se dilate en dedans un peu au-dessous du milieu et n'atteint pas l'extrémité de ces organes; pattes grêles. — Longueur, 3 millimètres environ.

Cap de Bonne-Espérance.

Ressemble à *A. infialis* Pic, mais l'avant-corps est plus foncé et plus densément ponctué.

COLÉOPTÈRES DE LA FAMILLE DES ANTHICIDES
RECUEILLIS PAR M. GERMAIN EN BOLIVIE,

PAR M. MAURICE PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les espèces et variétés décrites dans le présent article, toutes originaires de Cochabamba où elles ont été recueillies par M. Germain, ont été acquises par le Muséum de Paris avec la riche et précieuse collection Léon Fairmaire; elles font partie des Collections du Muséum⁽¹⁾.

Tomoderus (Pseudotomoderus) Germaini nov. sp.

Robustus, nitidus, rufo-brunneus, capite thoraceque plus minusve obscurioribus, antennis validis, nigris, ad basin et apice testaceis; thorace haud sulcato.

Robuste, brillant, roux brunâtre avec la tête et le prothorax d'ordinaire et variablement obscurcis, orné de quelques longs poils clairs épars; antennes robustes, foncées au milieu, plus ou moins testacées à la base et à l'extrémité; tête presque lisse, grosse, un peu plus large que le prothorax, rétrécie derrière les yeux qui sont foncés; prothorax plus long que large, presque lisse, à lobe antérieur large, non sillonné, lobe postérieur assez long, élargi en arrière et un peu impressionné sur son milieu; écusson petit, élytres bien plus larges que le prothorax, subovales, un peu rétrécis à l'extrémité, à épaules marquées mais arrondies, sans dépression antérieure marquée, à ponctuation large, écartée et irrégulièrement disposée; pattes peu robustes, testacées. — Longueur, 3 millim. 2-3 millim. 5.

(1) Toutes les espèces et variétés nouvelles décrites ici font également partie de la Collection Maurice Pic, à l'exception de *Anth. indistinctus*.